

Порядок проведення щеплень
Børnevaccinationsprogram i Ukraine 2020

Вік Alder	Щеплення проти Vacciner mod					
1 день 1 dag		Гепатиту В Hepatitis B				
3-5 днів 3-5 dage	Туберкульозу Tuberkulose					
2 місяці 2 måneder		Гепатиту В Hepatitis B	Дифтерії, кашлюка, правця Di-Te-Ki	Поліомієліту IPV (Injektion Polio)	Гемофільної інфекції HIB	
4 місяці 4 måneder			Дифтерії, кашлюка, правця Di-Te-Ki	Поліомієліту IPV (Injektion Polio)	Гемофільної інфекції HIB	
6 місяців 6 måneder		Гепатиту В Hepatitis B	Дифтерії, кашлюка, правця Di-Te-Ki	Поліомієліту OPV (Oral Polio)		
12 місяців 12 måneder					Гемофільної інфекції HIB	Кору, краснухи, паротиту MFR
18 місяців 18 måneder			Дифтерії, кашлюка, правця Di-Te-Ki	Поліомієліту OPV (Oral Polio)		
6 років 6 år			Дифтерії, правця di-Te	Поліомієліту OPV (Oral Polio)		Кору, краснухи, паротиту MFR
14 років 14 år				Поліомієліту OPV (Oral Polio)		
16 років 16 år			Дифтерії, правця di-Te			

[Vaccination \(moz.gov.ua\)](http://moz.gov.ua)

Vaccineanbefalinger til ukrainske børn

Børn med kendt vaccinationsstatus:

[Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram](#)

<p>DiTeKiPol</p> <p>I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. + booster 5 år.</p> <p>I Ukraine (kun DiTeKi): 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr. og 18 mdr. + booster på di-Te 6 år.</p>	<p><u>1. dosis givet tidligst ved 8 uger godkendes</u> Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 2 mdr. Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 6 mdr. Minimumsinterval til booster er 3 år.</p> <p>Der vælges Pentavac, hvis barnet mangler HIB ellers vælges Tetravac. Se under HIB nedenfor.</p> <p>Hvis der er givet 1 DiTeKi ved 2 mdr. gives 2 Pentavac med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet 2 DiTeKi ved 2 mdr. og 4 mdr. gives 1 Pentavac med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet 3 DiTeKi ved 2 mdr., 4 mdr. og 6 mdr. gives 1 Pentavac efter 6 mdr. samt 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet 4 DiTeKi ved 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr. og 18 mdr. gives 1 Tetravac efter 3-4 år.</p>
<p>IPV og OPV er sidestillet:</p> <p>I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. + booster 5 år.</p> <p>I Ukraine: 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr. og 18 mdr. + booster 6 år og 14 år.</p>	<p><u>1. dosis givet tidligst ved 8 uger godkendes</u> Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 1 md. Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 6 mdr. Minimumsinterval til booster er 3 år</p> <p>Der gives Pentavac såfremt barnet mangler HIB ellers vælges Tetravac. Se under HIB nedenfor.</p> <p>Hvis der er givet 1 IPV/OPV ved 2 mdr. gives 2 Pentavac med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet 2 IPV/OPV ved 2 mdr. og 4 mdr. gives 1 Pentavac med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet 3 IPV/OPV ved 2 mdr., 4 mdr. og 6 mdr. gives 1 Pentavac efter 6 mdr. samt 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet 4 IPV/OPV ved 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr. og 18 mdr. gives 1 Tetravac efter 3-4 år.</p> <p>Hvis der er givet korrekt DiTeKi allerede, men der mangler en eller flere poliovacciner, kan disse gives som IPV (Ren poliovaccine, Imovax Polio)</p>

<p>MFR</p> <p>I DK: 15 mdr. og 4 år.</p> <p>I Ukraine: 12 mdr. og 6 år.</p>	<p><u>1. dosis givet tidligst ved 12 måneder godkendes</u></p> <p>Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 1 md.</p> <p>Der tilbydes eventuelt manglende MFR-vacciner ved samme alder som i det danske børnevaccinationsprogram. Hvis barnet er 4 år eller ældre, gives MFR-vaccinerne med minimumsinterval.</p>
<p>Prevenar (PCV13)</p> <p>I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr.</p> <p>I Ukraine: intet tilbud.</p>	<p><u>Børn 0-12 mdr.: 3 doser</u> 1. dosis gives tidligst ved alder 3 mdr.* Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 1 md. Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 2 mdr.</p> <p><u>Børn over 12 mdr.: 2 doser</u> Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 2 mdr.</p> <p>*Hvis barnet opstarter vaccination i DK ved alder 3 mdr., følger det blot det danske børnevaccinationsprogram</p>
<p>HIB</p> <p>I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr.</p> <p>I Ukraine: 2 mdr., 4 mdr. og 12 mdr.</p>	<p><u>1. dosis givet tidligst ved 8 uger godkendes</u></p> <p><u>Børn 0-12 mdr.: 3 doser</u> Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 2 mdr. Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 6 mdr.</p> <p><u>Børn i alderen 1-5 år:</u> 1 dosis, hvis de ikke er tidligere HIB-vaccineret.</p>
<p>HPV</p> <p>I DK: 2 eller 3 doser afhængig af alder ved opstart. Piger i alderen 12-17 år Drenge født efter 1. juli 2007.</p> <p>I Ukraine: intet tilbud.</p>	<p><u>Børn under 15 år:</u> 2 doser, såfremt 2. dosis gives med maksimuminterval på 13 mdr. Ellers 3 doser.</p> <p><u>Børn over 15 år:</u> 3 doser</p>
<p>COVID-19 fra 12 år</p> <p>I DK: 2 doser Cominarty</p> <p>I Ukraine: 2 doser Cominarty</p>	<p><u>Børn fyldt 12 år til og med 17 år:</u> Tilbydes op til 2 doser alt efter tidligere antal vacciner.</p> <p>Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 21 dage</p>

Børn med ukendt eller usikker vaccinationsstatus

Børn under 5 år	<p>Der vaccineres uden at måle antistoffer: Samme intervaller som hvis barnet var 3 mdr. ved første stik. Der gives Pentavac.</p> <p>Ved kraftig lokal reaktion kan der en måned efter indgift måles antistoffer mod Di og Te.</p> <p>Obs antal doser af Prevenar og HIB ud fra alder.</p>
Børn på 5-17 år	<p>Der gives én DiTeKiPol – mål antistoffer for Di og Te én måned efter.</p> <p>Følger herefter anbefalingerne ud fra antistofsvaret. Antistofsvaret tetanus Antistofsvaret difteri</p> <p>Obs Prevenar er ikke længere relevant. Hib gives ikke til børn på 6 år eller derover.</p>

Vaccineanbefalinger til ukrainske voksne

MFR	<p>Der tilbydes én dosis ved ukendt eller usikker vaccinationsstatus, eller hvis de ikke har været tidligere smittet med mæslinger.</p> <p>Dog tilbydes kvinder i den fødedygtige alder, og som ikke er gravide, en MFR-vaccination selv om de har haft mæslinger og/eller fåresyge for at beskytte mod røde hunde.</p> <p>Anses herefter som værende færdigvaccineret.</p>
COVID-19	<p>Der tilbydes op til 3 vaccinationer med minimumsinterval alt efter antal tidligere vaccinationer.</p>
di-Te-ki-Pol (Repevax)	<p>Der tilbydes én dosis Repevax vaccination til alle voksne flygtninge fra Ukraine, hvis seneste polio vaccine er givet for mere end 1 år siden og/eller seneste difterivaccine er givet for mere end 5 år siden.</p> <p>Repevax er ikke registreret til primærvaccination, men SSI vurderer, at den kan anvendes hertil. Alternativt kan anvendes di-Te, evt. kombineret med polio monovaccine (Imovax polio)</p>
di-Te-ki	<p>Tilbydes til gravide i 3. trimester. Der kan med fordel tilbydes én dosis Repevax, hvis seneste polio vaccine er givet for mere end 1 år siden.</p>
di-Te (ved sårskade)	<p>Tilbydes ved skade der kræver di-Te booster. Hvis tilgængelig kan en dosis Repevax tilbydes, hvis seneste</p>

	<p>polio vaccine er givet for mere end 1 år siden og/eller seneste difterivaccine er givet for mere end 5 år siden.</p> <p>Ved behov for mere end én tetanusholdig vaccine tilbydes herefter di-Te booster.</p> <p>Ved ukendt eller usikker vaccinationsstatus vaccineres der herefter ifølge postekspositionsprofylakse anbefalingerne. Tetanus postekspositionsprofylakse</p>
Pneumokok vaccination (PPV23)	<p>Det anbefales at give PPV23 til risikogrupper herunder borgere, der er fyldt 65 år samt til borgere med kroniske lidelser i henhold til bekendtgørelsen (BEK nr. 368).</p>
Influenza	<p>Gives i henhold til de danske anbefalinger i sæson for vaccination.</p>